



**STIROL**  
**BioPHARM**

## КАТАЛОГ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ



### АГИСТАМ

**Показания для применения.** Симптоматическое лечение аллергического ринита и хронической идиоматической крапивницы.

**Противопоказания для применения.** Препарат противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к активному веществу или любому другому компоненту препарата.

**Способ применения и дозы.** Взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 таблетке (10 мг лоратадина) 1 раз в сутки. Детям до 12 лет с массой тела больше 30 кг – 10 мг (1 таблетку) 1 раз в сутки. Пациентам пожилого возраста и больным с почечной недостаточностью коррекция дозы не требуется.

Детям с массой тела менее 30 кг применять лоратадин в виде сиропа.

**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению.



### АМБРОКСОЛ-РЕТАРД

Таблетки пролонгированного действия.

**Показания для применения.** Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Муколитики.

**Противопоказания для применения.** Гиперчувствительность к амброксолу или к другим компонентам препарата. Детский возраст.

**Способ применения и дозы.** Взрослым назначают внутрь по 1 таблетке в сутки утром или вечером после приема пищи. Срок лечения – до 14 дней. Следует проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания длятся дольше 14 дней и/или усиливаются, несмотря на прием Амброксола-ретард.

**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению.



### АСПЕКАРД

#### Показания к применению:

- нестабильная стенокардия и стабильная стенокардия;
- профилактика повторного инфаркта миокарда;
- профилактика повторной транзиторной ишемической атаки (ТИА) и повторного ишемического инсульта у пациентов, ранее перенесших нарушение мозгового кровообращения;
- профилактика тромботических осложнений после операций и инвазивных вмешательств на сосудах (таких, как аортокоронарное шунтирование, эндартерэктомия сонных артерий, артериовенозное шунтирование, ангиопластика и стентирование коронарных артерий, ангиопластика сонных артерий).

#### Способ применения и дозы.

Препарат принимают внутрь за 30-60 минут до еды, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.

Для снижения риска смерти пациентам с подозрением на острый инфаркт миокарда применяют препарат в дозе 100-300 мг в сутки. В течение 30 дней после инфаркта миокарда продолжают принимать поддерживающую дозу 100-300 мг в сутки.

Через 30 дней следует рассмотреть вопрос о дальнейшей профилактике рецидива инфаркта миокарда.

*Чтобы достичь скорой абсорбции при применении для этого показания первую таблетку необходимо разжевать.*

Для снижения риска заболевания и смерти пациентам, перенесшим инфаркт миокарда применяют 100-300 мг в сутки.

Для вторичной профилактики инсульта применяют препарат в дозе 100-300 мг в сутки.

Для снижения риска ТИА и инсульта у пациентов с ТИА таким больным применяют 100-300 мг в сутки.

Для снижения риска развития заболевания и смерти пациентам со стабильной и нестабильной стенокардией применяют 100-300 мг в сутки.

Для профилактики тромбоэмболии после операций на сосудах (чрескожная транслюминарная катетерная ангиопластика (PTCA), эндартерэктомия сонной артерии аортокоронарное шунтирование (CABG), артериовенозное шунтирование) применяют препарат в дозе 100-200 мг в сутки ежедневно или 300 мг в сутки через день.

**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению.



### **АСПЕТЕР**

**Фармакотерапевтическая группа.** Анальгетики и антипиретики. Кислота ацетилсалициловая.

#### **Показания к применению:**

- нестабильная стенокардия и стабильная стенокардия;
- профилактика повторного инфаркта миокарда;
- профилактика повторной транзиторной ишемической атаки (ТИА) и повторного ишемического инсульта у пациентов, ранее перенесших нарушение мозгового кровообращения;
- профилактика тромботических осложнений после операций и инвазивных вмешательств на сосудах (таких, как аортокоронарное шунтирование, эндартерэктомия сонных артерий, артериовенозное шунтирование, ангиопластика и стентирование коронарных артерий, ангиопластика сонных артерий).

Применяется в качестве антиагрегантного и антитромботического средства.

Может использоваться как анальгетическое и антипиретическое средство для симптоматического лечения головной боли, зубной боли; боли в горле, обусловленной простудой; альгодисменореи; боли в мышцах и суставах; боли в спине; умеренной боли, обусловленной артритом. При простуде или острых респираторных заболеваниях для симптоматического облегчения боли и жара.

#### **Способ применения и дозы.**

Аспетер применяют внутрь после еды, запивая достаточным количеством жидкости.

Как антиагрегантное средство по 1 таблетке один раз в сутки.

Как анальгетическое и антипиретическое средство применяют по 1 таблетке один раз в сутки, большую дозировку определяет лечащий врач.

Аспетер нельзя применять более 3-5 дней и в дозе больше 1 таблетки в сутки без консультации врача.

**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению.



### **ВИТАМИН С 500 мг. АПЕЛЬСИНОВЫЙ/КЛУБНИЧНЫЙ**

**Показания для применения.** Лечение гипо- и авитаминоза С. Удовлетворение повышенной потребности организма в витамине С в период острых респираторных и инфекционных заболеваний; в период реконвалесценции после тяжелых заболеваний, оперативных вмешательств; при различных интоксикациях, геморрагических диатезах, обусловленных снижением свертывающих свойств крови, заболеваниях соединительной ткани (ревматоидный артрит), кровотечениях (носовые, легочные, маточные); при лучевой болезни, гепатите, холецистите, болезни Аддисона; при вяло заживающих ранениях мягких тканей, инфицированных ранах и переломах костей.

**Способ применения и дозы.** Препарат принимать внутрь после еды, разжевывая таблетку.

Взрослым и детям с 14 лет с лечебной целью необходимо принимать по 1 таблетке (500 мг) в сутки. Срок лечения – 10-15 суток.

При сильной простуде и инфекционных заболеваниях для взрослых рекомендован прием по 1-2 таблетки (500-1000 мг) в сутки (в 2 приема) в течение 7-10 суток.

Далее – по 1/2 таблетки (250 мг) в сутки.

**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению.



### **ГЕПАРСИЛ**

**Показания к применению.**

Токсические поражения печени: для поддерживающего лечения у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями печени или циррозом печени.

**Способ применения и дозы.**

Принимают внутрь после еды, не разжевывая, с небольшим количеством жидкости.

Разовая доза для взрослых и детей в возрасте от 14 лет составляет 1-2 капсулы (70-140 мг силимарина), применяют 3 раза в сутки.

Курс лечения определяет врач индивидуально, в зависимости от характера и течения заболевания.

Средняя длительность лечения - 3 месяца.

**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению.



## **ДИКЛОФЕНАК С ПАРАЦЕТАМОЛОМ**

**Показания для применения.** Острая боль (мышечная, головная, зубная, с локализацией в позвоночнике), боль при несуставном ревматизме, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилите, остеоартрозе, спондилоартрите, острых приступах подагры, первичной дисменорее, аднексите, фаринготонзиллите, отите. Посттравматический и послеоперационный болевой синдром.

**Способ применения и дозы.** Дозу определяет врач для каждого больного индивидуально, в зависимости от возраста пациента, характера и течения заболевания, индивидуальной переносимости и лечебной эффективности препарата. Взрослым и детям старше 14 лет – по 1 таблетке 2-3 раза в сутки после еды.

Продолжительность лечения составляет не более 5-7 дней и зависит от течения заболевания. Максимальная суточная доза препарата для взрослых и детей старше 14 лет составляет не более 3 таблеток.

Препарат рекомендуется применять не разжевывая и запивая половиной стакана воды.

**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению.



## **ИБУПРОФЕН**

**Показания к применению.**

Применяется при головной и зубной боли, дисменорее, невралгии, болях в спине, суставах, мышцах, при ревматических болях, а также при симптомах простуды и гриппа.

**Способ применения и дозы.**

Для перорального применения при непродолжительном использовании.

Рекомендуется первую суточную дозу принимать утром до еды (для быстрого всасывания), следующие дозы - на протяжении суток после еды (для постепенного всасывания). Препарат назначают взрослым и детям старше 12 лет. Применяют по 1 капсуле каждые 4-6 часов.

Капсулы необходимо запивать водой. Не принимать более 4 капсул на протяжении 24 часов.

Максимальная суточная доза составляет 1200 мг.

Пациенты пожилого возраста не нуждаются в специальной дозировке.

Рекомендуется применять минимально эффективную дозу препарата в течение непродолжительного периода времени, необходимого для избавления от симптомов заболевания.

Если симптомы заболевания сохраняются дольше 3 дней, следует обязательно обратиться к врачу для уточнения диагноза и коррекции схемы лечения.

**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению.



## **КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ ФРУКТОВЫЙ**

### **Показания к применению.**

Заболевания, сопровождающиеся гипокальциемией, повышением проницаемости клеточных мембран, нарушением проведения нервных импульсов в мышечной ткани. Гипопаратиреоз (латентная тетания, остеопороз), нарушение обмена витамина D (рахит, спазмофилия, остеомаляция), гиперфосфатемия у больных с хронической почечной недостаточностью. Повышенная потребность в кальции (период интенсивного роста у детей и подростков; беременность, период кормления грудью), недостаточное содержание  $\text{Ca}^{2+}$  в пище, нарушение его обмена в постменопаузальном периоде, переломы костей. Усиленное выведение  $\text{Ca}^{2+}$  (продолжительный постельный режим, хроническая диарея, гипокальциемия при продолжительном приеме диуретиков, противоэпилептических лекарственных средств, глюкокортикостероидов). В комплексной терапии: кровотечения различной этиологии, аллергические заболевания (сывороточная болезнь, крапивница, лихорадочный синдром, зудящие дерматозы, ангионевротический отек); бронхиальная астма, дистрофические алиментарные отеки, легочный туберкулез, эклампсия, паренхиматозный гепатит, токсические поражения печени, нефрит. Отравление солями магния, щавелевой кислотой, растворимыми солями фтористой кислоты (при взаимодействии с кальция глюконатом образуются нерастворимые и нетоксичные кальция оксалат и кальция фторид).

### **Способ применения и дозы.**

Кальция глюконат применяют внутрь перед едой. Таблетку необходимо разжевать или измельчить. Разовые дозы: взрослые и дети старше 14 лет – 1-3 г (2-6 таблеток), дети в возрасте от 3 до 4 лет – 1 г (2 таблетки), дети в возрасте от 5 до 6 лет – 1-1,5 г (2-3 таблетки), дети в возрасте от 7 до 9 лет – 1,5-2 г (3-4 таблетки), дети в возрасте от 10 до 14 лет – по 2-3 г (4-6 таблеток). Принимать 2-3 раза в сутки. Суточная доза для людей пожилого возраста не должна превышать 2 г (4 таблетки).

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от состояния пациента.

Детям в возрасте до 3 лет не назначают препарат в данной лекарственной форме.

**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению.



## ЛОПЕРАМИД

### Показания к применению.

Симптоматическое лечение острой и хронической диареи.

У пациентов с илеостомой для уменьшения частоты и объема стула, а также для придания калу более твердой консистенции.

### Способ применения и дозы.

Капсулы проглатывают не разжевывая и запивая большим количеством жидкости.

Применяют взрослым и детям старше 6 лет.

Острая диарея:

начальная доза - 2 капсулы (4 мг) для взрослых и 1 капсула (2 мг) для детей; в дальнейшем - 1 капсула (2 мг) после каждого следующего жидкого стула.

Срок лечения острой диареи - до 5 дней.

При острой диарее, если на протяжении 48 часов не наблюдается клинического улучшения, прием препарата следует прекратить.

Хроническая диарея:

начальная доза для взрослых - 2 капсулы (4 мг) ежедневно, для детей - 1 капсула (2 мг) ежедневно; эта доза корректируется в дальнейшем так, чтобы частота твердого стула составляла 1 -2 раза в сутки, которая обычно достигается при поддерживающей дозе 1 -6 капсул (2 мг - 12 мг) ежедневно.

Максимальная суточная доза при хронической диарее для взрослых - 8 капсул (16 мг); для детей; она должна быть рассчитана, исходя из массы тела ребенка (3 капсулы на 20 кг массы тела ребенка).

**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению.



## НОВАЛГИН.

**Показания для применения.** Симптоматическое лечение головной, зубной, менструальной, послеоперационной и ревматической боли; лихорадочных состояний при простудных заболеваниях и гриппе.

**Способ применения и дозы.** Новалгин применяют перорально. Таблетки запивают достаточным количеством жидкости.

Взрослые: разовая доза 1-2 таблетки. Принимать не более 3 разовых доз в сутки.

Дети 12-18 лет: разовая доза 1 таблетка. Принимать не более 3 разовых доз в сутки.

Продолжительность лечения не должна превышать одной недели. Не следует превышать рекомендуемую дозу.

**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению.



### **НОШПА-СБФ**

#### **Показания к применению.**

С лечебной целью при:

- спазмах гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта: холецистолитиазе, холангиолитиазе, холецистите, перихолецистите, холангите, папиллите;
- спазмах гладкой мускулатуры при заболеваниях мочевого тракта: нефролитиазе, уретеролитиазе, пиелите, цистите, тенезмах мочевого пузыря.

Как вспомогательное лечение при:

- спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, кардио-и/или пилороспазме, энтерите, колите, спастическом колите с запором и синдроме раздраженного кишечника, сопровождающееся метеоризмом;
- головной боли напряжения;
- гинекологических заболеваниях (дисменорея).

#### **Способ применения и дозы.**

Взрослым: обычная средняя доза составляет 120-240 мг (3-6 таблеток) в сутки за 2-3 приема.

Детям 6-12 лет: максимальная суточная доза составляет 80 мг, разделенная на 2 приема (по 1 таблетке 2 раза в сутки).

Детям старше 12 лет: максимальная суточная доза составляет 160 мг, разделенная на 2-4 приема (по 1 таблетке 2-4 раза в сутки).

Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально.

**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению.



## **ОМЕПРАЗОЛ.**

### **Показания к применению**

Взрослые:

- язва двенадцатиперстной кишки;
- язва желудка;
- НПВП - ассоциированные язвы и эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки;
- эрадикация *Helicobacter pylori* при язвенной болезни (в комбинации с соответствующей антибактериальной терапией);
- рефлюкс - эзофагит;
- симптоматическая гастроэзофагельная рефлюксия болезнь;
- диспепсия, связанная с повышенной кислотностью;
- синдром Золлингера-Эллисона.

Дети и подростки

Дети старше 2 лет с массой тела не менее 20 кг:

- рефлюкс - эзофагит;
- симптоматическая гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Дети старше 4 лет и подростки:

- язва двенадцатиперстной кишки, вызванная *Helicobacter pylori*.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь, запивая небольшим количеством воды (содержимое капсулы нельзя разжевывать).

#### **Взрослые**

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в фазе обострения - по 1 капсуле (20 мг) в сутки в течение 2-4 недель (в резистентных случаях до 2 капсулы в сутки).

Язвенная болезнь желудка в фазе обострения и эрозионо-язвенный эзофагит – по 1-2 капсуле в сутки в течение 4 - 8 недель.

Эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, вызванные приемом НПВП - по 1 капсуле в сутки в течение 4-8 недель,

Эрадикация *Helicobacter pylori* - по 1 капсуле 2 раза в сутки в течение 7 дней в сочетании с антибактериальными средствами.

Противорецидивное лечение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки - по 1 капсуле в сутки.

Противорецидивное лечение рефлюкс-эзофагита - 1 капсула в сутки в течение длительного времени (до 6 месяцев).

Синдром Золлингера - Эллисона - доза подбирается индивидуально в зависимости от исходного уровня желудочной секреции, обычно начиная с 60 мг в сутки. При необходимости дозу увеличивают до 80 - 120 мг в сутки, в этом случае ее делят на два приема.

Симптоматическая гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь - рекомендуемая доза омепразола 20 мг 1 раз в

сутки. Препарат обеспечивает быстрое устранение симптомов. Если после 4 недель лечения (омепразол 20 мг 1 раз в сутки) симптомы не исчезают, рекомендуется дополнительное обследование пациента.

Диспепсия, связанная с повышенной кислотностью - для облегчения болей и/или устранения ощущений дискомфорта в эпигастриальной области, с изжогой или без изжоги, назначают омепразол 20 мг 1 раз в сутки. Если после 4 недель лечения (омепразол 20 мг 1 раз в сутки) симптомы не исчезают, рекомендуется дополнительное обследование пациента.

#### **Дети и подростки**

Рефлюкс-эзофагит и симптоматическая глетроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Детям в возрасте старше 2 лет с массой тела более 20 кг назначают Омепразол в дозе 20 мг один раз в сутки. При необходимости возможно увеличение дозы до 40 мг один раз в сутки. Рекомендуемая продолжительность лечения и случае рефлюкс эзофагита составляет 4-8 недель. Рекомендуемая продолжительность лечения в случае симптоматической гастроэзофагеальной рефлюксной болезни составляет 2-4 недели. Если после 2-4 недель лечения контроль симптомов заболевания не был достигнут, рекомендуется дополнительное обследование пациента.

Язва двенадцатиперстной кишки, вызванная *Helicobacter pylori*

При выборе схемы терапии следует учитывать официальные национальные, региональные и местные рекомендации, касающиеся резистентности микроорганизмов к антибактериальным средствам, продолжительности терапии (наиболее часто - 7 дней, но в ряде случаев - до 14 дней) и правильного применения антибактериальных препаратов.

Терапию необходимо проводить под наблюдением специалиста.

Для детей в возрасте старше 4 лет рекомендуемая доза омепразол 20 мг 1 раз в день в комбинации с антибактериальными препаратами.

**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению.

#### **ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг. Таблетки**

**Показания к применению.** Головная боль, включая мигрень и головную боль напряжения; боль в спине; ревматическая боль; боль в мышцах; периодические боли у женщин; невралгии; зубная боль; облегчение симптомов простуды и гриппа, таких как лихорадка, ломота, боль.

**Способ применения и дозы.** Препарат предназначен для перорального приема.



Взрослые и дети с 12 лет: по 1-2 таблетки каждые 4-6 часов при необходимости. Интервал между приемами должен составлять не менее 4 часов. Максимальная суточная доза – не более 4000 мг на протяжении 24 часов.

Дети (6-12 лет): по 1 таблетке (325 мг) каждые 4-6 часов при необходимости, с интервалом между приемами не менее 4 часов. Принимать не более 4 доз в течение 24 часов. Продолжительность лечения определяет врач.

Максимальный срок применения без рекомендации врача – 3 дня.

**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.



	<p>Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению.</p> <p><b>ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг. Капсулы</b></p> <p><b>Показания к применению.</b> Головная боль, включая мигрень и головную боль напряжения; боль в спине; ревматическая боль; боль в мышцах; периодические боли у женщин; невралгии; зубная боль; облегчение симптомов простуды и гриппа, таких как лихорадка, ломота, боль.</p> <p><b>Способ применения и дозы.</b> Препарат предназначен для перорального приема. Взрослым и детям с 12 лет: по 1-2 капсулы каждые 4-6 часов при необходимости. Интервал между приемами должен составлять не менее 4 часов. Максимальная суточная доза - не более 4000 мг на протяжении 24 часов. Детям (6-12 лет): по 1 капсуле (325 мг) каждые 4-6 часов при необходимости, с интервалом между приемами не менее 4 часов. Принимать не более 4 доз в течение 24 часов. Продолжительность лечения определяет врач. Максимальный срок применения без рекомендации врача - 3 дня.</p> <p><b>Предупреждения при употреблении:</b> индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.</p> <p>Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению</p>
	<p><b>СЕНАДЕКС</b></p> <p><b>Показания для применения.</b> Запоры, обусловленные атонией кишечника разной этиологии. Подготовка к рентгенологическим исследованиям.</p> <p><b>Способ применения и дозы.</b> Дозировка подбирается индивидуально. Взрослым и детям в возрасте от 12 лет рекомендовано принимать по 2 таблетки 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза составляет 4 таблетки. Пациентам пожилого возраста стоит начинать лечение с дозы 1 таблетка. Следует принимать наименьшую эффективную дозу препарата, необходимую для восстановления нормальной функции желудка. Препарат предназначен для кратковременного применения. Слабительные средства не следует принимать без соответствующей рекомендации врача дольше 1 недели.</p> <p><b>Предупреждения при употреблении:</b> индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.</p> <p>Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению</p>



## **ЦИННАРИЗИН**

### **Показания для применения.**

Поддерживающее лечение при симптомах лабиринтных расстройств, которые включают головокружение, шум в ушах, нистагм, тошноту и рвоту.

Профилактика болезни движения.

Профилактика мигрени.

Поддерживающее лечение при симптомах цереброваскулярного происхождения, которые включают головокружение, шум в ушах (тинитус), головную боль сосудистого происхождения, раздражительность, потерю памяти и неспособность сосредоточиваться.

Поддерживающее лечение при симптомах периферических сосудистых расстройств, которые включают болезнь Рейно, акроцианоз, перемежающуюся хромоту, трофические нарушения, трофические и варикозные язвы, парестезию, ночные спазмы в конечностях, холодные конечности.

### **Способ применения и дозы.**

Взрослым и детям старше 12 лет:

Расстройства мозгового кровообращения: 1 таблетка по 25 мг 3 раза в день. Расстройства периферического кровообращения: 2-3 таблетки по 25 мг 3 раза в день.

Нарушение равновесия: 1 таблетка по 25 мг 3 раза в день.

Болезни движения: 1 таблетка по 25 мг за полчаса до прогулки с повторением каждые 6 часов.

Следует отдавать предпочтение приему циннаризина после еды.

Максимальная доза не должна превышать 225 мг (9 таблеток) в сутки. Поскольку эффект при головокружении зависит от дозы, дозировку следует постепенно повышать.

**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению



## **ЭНАФРИЛ**

**Показания к применению.** Лечение артериальной гипертензии у пациентов, которым показана комбинированная терапия.

Способ применения и дозы

Артериальная гипертензия

Энафрил следует принимать регулярно в одно и тоже время, предпочтительно утром, во время или после еды, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости. Обычная доза для взрослых составляет одну таблетку один раз в сутки. В случае необходимости дозировка может быть увеличена до двух таблеток один раз в сутки.

Предшествующее лечение диуретиками

Симптоматическая гипотензия может возникнуть в начале терапии препаратом; она чаще встречается у пациентов, у которых предшествующая терапия диуретиками вызвала нарушение водно-электролитного баланса. Терапия

диуретиками должна быть прекращена за 2-3 дня до начала терапии Энафрилом.  
Дозировка при почечной недостаточности  
Для пациентов с нарушением функции почек со скоростью клубочковой фильтрации 30 мл/мин и ниже применение препарата противопоказано. У пациентов со скоростью клубочковой фильтрации в диапазоне от 30 до 80 мл/мин препарат должен использоваться только после предварительного подбора доз каждого из компонентов.  
**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.  
Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению



**ЭРЕКТИЛ.**  
**Показания к применению.**  
Лечение нарушений эрекции, которые определяются как неспособность достичь и поддержать эрекцию полового члена, необходимую для успешного полового акта.  
Для эффективного действия Эректила необходимо сексуальное возбуждение.  
**Способ применения и дозы.**  
Препарат применяют перорально.  
Рекомендуемая доза препарата Эректил составляет 50 мг и применяется, при необходимости, примерно за час до полового акта. В зависимости от эффективности и переносимости препарата дозу можно увеличить до 100 мг или снизить до 25 мг. Максимальная рекомендуемая доза составляет 100 мг.  
Максимальная рекомендуемая частота применения препарата составляет 1 раз в сутки. При применении препарата Эректил во время приема пищи, действие препарата может наступать позднее, чем при его применении натощак.  
Пациенты пожилого возраста.  
Необходимость в коррекции дозы у пациентов пожилого возраста отсутствует.  
Пациенты с почечной недостаточностью.  
Пациентам с почечной недостаточностью легкой и умеренной степени тяжести (клиренс креатина от 30 до 80 мл/мин) рекомендована обычная доза препарата.  
Поскольку у пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени (клиренс креатина ниже 30 мл/мин) клиренс силденафила снижен, рекомендуемая доза составляет 25 мг. В зависимости от эффективности и переносимости препарата дозу можно увеличить до 50 мг и 100 мг.  
Пациенты с печеночной недостаточностью.  
Поскольку у пациентов с печеночной недостаточностью (например, циррозом) клиренс силденафила снижен, рекомендуемая доза препарата составляет 25 мг. В зависимости от эффективности и переносимости препарата дозу можно увеличить до 50 мг и 100 мг.  
Пациенты, принимающие другие лекарственные средства.  
Рекомендованная начальная доза препарата пациентам, которые применяют ингибиторы СYP3A4, за исключением ритонавира, составляет 25 мг. При одновременном приеме с ритонавиром максимальная разовая доза силденафила не должна превышать 25 мг в течение 48 часов.

С целью минимизации риска развития ортостатической гипотензии, состояние пациентов, принимающих блокаторы альфа-адренорецепторов, должно быть стабилизировано до начала применения силденафила. Также рекомендованная доза силденафила составляет 25 мг.

Препарат Эректил не предназначен для применения женщинами.

**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению



### **ЦИТРАМОН-ФОРТЕ**

#### **Показания к применению.**

Слабый или умеренный болевой синдром: головная или зубная боль, боль при первичной дисменорее; мигрень, артралгия, миалгия, невралгия, особенно заболевания воспалительного происхождения (фронтит, гайморит), ревматические заболевания, болезни, которые сопровождаются гипертермией различной этиологии (как жаропонижающее средство).

#### **Способ применения и дозы.**

Препарат применяют вовнутрь во время или после еды. Назначают взрослым и детям старше 16 лет по 1 таблетке 2-3 раза в день. Для купирования острой боли - 2 таблетки однократно. Максимальная суточная доза составляет 6 таблеток в 3 приема. Препарат не следует принимать больше 5-и дней в качестве обезболивающего средства и больше 3-х дней - в качестве жаропонижающего (без назначения и наблюдения врача).



**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению



## **Детравен**

### **Показания к применению.**

Детравен показан для терапии симптомов хронических заболеваний вен (устранения и облегчения симптомов).

Терапия симптомов венозно-лимфатической недостаточности: боль; судороги нижних конечностей; ощущение тяжести и распирания в ногах; «усталость» ног.

Терапия проявлений венозно-лимфатической недостаточности: отеки нижних конечностей; трофические изменения кожи и подкожной клетчатки; венозные трофические язвы.

Симптоматическая терапия острого и хронического геморроя.

### **Способ применения и дозы.**

Для перорального применения.

Назначают взрослым.

Длительность терапии определяет врач в зависимости от показаний к применению и течения заболевания.

*Венолимфатическая недостаточность.* Рекомендуемая доза составляет 2 таблетки в сутки: 1 таблетка — днем и 1 таблетка — вечером во время еды. После недели применения можно принимать 2 таблетки в сутки однократно во время еды.

*Геморроидальная болезнь.*

Лечение эпизодов острого геморроя: по 6 таблеток в сутки в течение 4 дней, затем по 4 таблетки в сутки в течение следующих 3 дней. Принимать во время еды. Суточное количество таблеток разделить на 2–3 приема.

Поддерживающая терапия – 2 таблетки в сутки однократно во время еды.

*Дети.* Данные по применению лекарственного средства Детравен детям отсутствуют.

**Предупреждения при употреблении:** индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Перед началом применения препарата посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению