



STIROL
*Bio*PHARM

КАТАЛОГ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ РФ



«ВИТАМИН С 500 МГ С АПЕЛЬСИНОВЫМ ВКУСОМ»

Рекомендации по применению: дополнительный источник витамина С

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Способ употребления: по 1 таблетке 2 раза в день во время приема пищи. Длительность курса составляет 1 месяц.

Предупреждения при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью, фенилкетонурия.



«ВИТАМИН С 500 МГ С АНАНАСОВЫМ ВКУСОМ»

Рекомендации по применению: дополнительный источник витамина С

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Способ употребления: по 1 таблетке 2 раза в день во время приема пищи. Длительность курса составляет 1 месяц.

Предупреждения при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью, фенилкетонурия.



«ВИТАМИН С 500 МГ С ЗЕМЛЯНИЧНЫМ ВКУСОМ»

Рекомендации по применению: дополнительный источник витамина С

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Способ употребления: по 1 таблетке 2 раза в день во время приема пищи. Длительность курса составляет 1 месяц.

Предупреждения при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью, фенилкетонурия.



«ВИТАМИН С 500 МГ С КЛУБНИЧНЫМ ВКУСОМ»

Рекомендации по применению: дополнительный источник витамина С

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Способ употребления: по 1 таблетке 2 раза в день во время приема пищи. Длительность курса составляет 1 месяц.

Предупреждения при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью, фенилкетонурия.



«ВИТАМИН D₃ СБФ»

Рекомендации по применению: дополнительный источник витамина D

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Способ употребления: взрослым – по 1 таблетке в день во время еды. Продолжительность приема – 2 месяца. При необходимости прием можно повторить.

Предупреждения при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью.



«ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА СБФ»

Рекомендации по применению: дополнительный источник янтарной кислоты

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Способ употребления: взрослым принимать по 1-2 таблетки в день непосредственно перед едой. Продолжительность приема – 1 месяц.

Предупреждения при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью.



«МАГНИЙ + В6 СБФ»

Рекомендации по применению: дополнительный источник магния и витамина В6.

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Способ употребления: взрослым принимать по 2 таблетки 3 раза в день или по 3 таблетки 2 раза в день во время еды, запивая стаканом воды. Продолжительность приема – 1 месяц.

Предупреждения при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью.



«ЦинкМакс СБФ»

Рекомендации по применению: дополнительный источник цинка.

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Способ употребления: взрослым принимать по 2 таблетки 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием БАД можно повторить.

Предупреждения при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью.



«ГЕПАРСИЛ СБФ»

Рекомендации по применению: дополнительный источник флаволигнанов.

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Способ употребления: взрослым принимать по 1 капсуле 1 раз в день после еды.

Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием БАД можно повторить.

Предупреждения при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью.



«ВИТАМИН Д₃+КАЛЬЦИЙ, апельсиновый»

Рекомендации по применению: источника витамина D₃.

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Способ употребления: взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время или после еды, разжевывая или рассасывая таблетку до полного растворения. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Предупреждения при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью.



«ВИТАМИН Д₃+КАЛЬЦИЙ, клубничный»

Рекомендации по применению: источника витамина D₃.

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Способ употребления: взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время или после еды, разжевывая или рассасывая таблетку до полного растворения. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Предупреждения при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью.



«ВИТАМИН D₃+КАЛЬЦИЙ, лимонный»

Рекомендации по применению: источника витамина D₃.

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Способ употребления: взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время или после еды, разжевывая или рассасывая таблетку до полного растворения. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Предупреждения при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью.



«ВИТАМИН D₃+КАЛЬЦИЙ, фруктовый»

Рекомендации по применению: источника витамина D₃.

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Способ употребления: взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время или после еды, разжевывая или рассасывая таблетку до полного растворения. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Предупреждения при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью.



«ТауринКардио СБФ»

Рекомендации по применению: источник таурина

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Способ употребления: взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды.

Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием БАД можно повторять 3-4 раза в год.

Предупреждения при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью.



«Сенна Экстракт СБФ»

Рекомендации по применению: дополнительный источник антрахинонов (сеннозидов).

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Способ употребления: взрослым по 1 таблетке в день во время еды. Продолжительность приема - 2 недели. При необходимости прием БАД можно повторить через месяц.

Предупреждения при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью.



«Аргинин СБФ»

Рекомендации по применению: источника аргинина. Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды, запивая 1 стаканом воды. Продолжительность приема - 1 месяц. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Предупреждения при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью.



«Энтеростаб СБФ»

Рекомендации по применению: дополнительный источник витамина С, источник янтарной кислоты. Взрослым принимать по 1 таблетке 2-3 раз в день во время еды, Таблетки глотать, не разжевывая, запивая достаточным количеством воды.

Продолжительность приема - 10-14 дней.

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Предупреждения при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью.

